

# 花卉類

商品名(粒状)	時期	施用量
アルム粒剤 強力アルム顆粒	ポット栽培・育苗期	2～3g/ポット
	本圃場	15kg/10a
堆肥等の施用時や耕耘時に同時施用して下さい。 葉の枯れあがりの気配時には10kg/10a追施用して下さい。		

商品名(液状)	時期	施用量
ニューベルキング500	挿芽・育苗期	500倍液を灌水・散布
アルム『純』	定植時	1000倍液にどぶ漬け
	定植以後	1000～2000倍液を灌水・灌注 で10日毎に施用して下さい。
	葉面散布	1000倍液を14日毎に散布

蘭系統はやや薄めに施用して下さい。

アルム純・ベルキング → 液肥・灌水時に合わせて同時施用して下さい。

アルム純 → 葉面散布での害虫忌避・阻害効果もあります。

アルム純 → 農薬との混用は1000倍液で施用して下さい。その時の農薬の希釈倍率は規定より薄くして下さい。(減農薬)

## 強力アルム顆粒の効果

- \* 土壌のバランスも整えます。
- \* 活着促進
- \* 連作障害の軽減
- \* 土壌・根圏微生物相の改善。

## アルム『純』・ベルキングの効果

- \* 節間がつまる。
- \* 葉・花色の向上
- \* 育苗期の徒長防止
- \* 耐病性の向上

注意 農薬との混用につきましてはボルドー液・アルカリ硫黄剤との混用は避けて下さい。他の農薬との混用は1000倍以上の希釈でご使用ください。